

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Circonscription
PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, CORSE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 BORGIO -

DLP 13 - 2 - 85485075

☎ (95) 36.05.70



Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n° 49

du 25 janvier 1985

- Excoriose, Esca, Eutypiose de la vigne : les maladies du bois doivent être combattues après la taille.
- Cloque de l'Amandier et du Pêcher.

*** Excoriose** : bois craquelés et blanchiment de l'écorce.


On l'observe sur les premiers entre-nœuds, à la base des rameaux. Les bois sont cassants et présentent de nombreuses craquelures (aspect de boutonnière), accompagnées de blanchiment de l'écorce.

- choisir les bois les plus sains.
- brûler les bois morts.
- traiter après la taille sur bois bien ressuyés avec une solution apportant 625 g/hl d'arsénite de sodium (300 à 500 litres de bouillie à l'hectare).

➡ Il est possible de traiter après le débourrement mais le traitement d'hiver est plus efficace.

*** Esca** : bois jaunâtre, mou comme de l'amadou.

Au cours de l'été, vous avez pu observer des dessèchements brutaux de certaines souches lors de journées chaudes. Dans certains cas, le dépérissement peut être plus progressif.



Coupe du tronc

Une coupe transversale du bois fait apparaître une partie centrale, molle et jaunâtre comme de l'amadou.

ATTENTION : cette maladie est en extension :

- brûler les bois morts.
- traiter sur bois bien ressuyés avec de l'arsénite de soude à 1250 g/hl (300 à 500 litres de bouillie à l'hectare).



blanchiment
des écorces
et formation
des pycnides

crevasses
profondes et
étranglement
à la base
des rameaux.


L'arsénite de soude est un produit très toxique, à manipuler avec précaution, en respectant scrupuleusement les indications portées sur les emballages.

*** Eutypiose** : une partie de souche dépérissante.

La présence du champignon *Eutypa Armeniacae* a été confirmée par analyse en CASINCA.

D'autres cas existent, mais cette maladie reste localisée à certaines parcelles, quelquefois même à quelques pieds.

Une partie de la souche dépérit : pousses rabougries et jaunes, enroulées. Une coupe transversale du bois met en évidence une section brune, de consistance dure, violacée, sèche et bien délimitée.



CYCLE BIOLOGIQUE DE L'EUTYPA ARMENIACAE

- Brûler les souches mortes et tous les déchets de taille.
- Eviter les grosses plaies de taille.
- Badigeonner les plaies dans les 24 H. avec du Benomyl ou Carbendazime à 12,5 g de matière active par litre.

*** Cloque de l'amandier et du pêcher**

La protection doit débuter en pré-débourrement, en utilisant 500 g de cuivre métal/hl.

La bouillie devra être suffisamment abondante pour atteindre tous les bourgeons.

A partir du stade B, employer uniquement des fongicides de synthèse :

- captafol (Difosan, Orthodifolatan) 120 g de M.A./hl
- captane (Nombreuses spécialités) 250 g de M.A./hl
- ferbame (Ferbamate, Sepifer) 175 g de M.A./hl incompatible avec les produits cupriques et bouillies basiques.
- thirame (Nombreuses spécialités) 175 g de M.A./hl
- zirame (Nombreuses spécialités) 175 g de M.A./hl



Bourgeon gonflé

B

(C) : SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1985 - Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation.